

Gama NantaMilk bovinos

NANTAMILK **BRONCE**

DEFINIÇÃO / POSICIONAMENTO:

Leite de substituição para vitelos tipo "0" sem leite desnatado. Recomendado a partir da 3ª semana de vida, em programas duplos.

CARACTERÍSTICAS

- 64% de soro de leite em pó.
- 18% de gorduras vegetais (palma, coco e girassol).
- Fontes de proteína de origem láctea e vegetal de alta digestibilidade.
- Probióticos estimuladores da atividade digestiva.

BENEFÍCIOS

- Facilita um maior consumo por não formar coágulo no abomaso.
- Gorduras vegetais de máxima digestibilidade.
- Acidificação que facilita a sua conservação após reconstituição por um maior número de horas.
- Boa dissolução sem formação de grumos e sedimentos.

MODO DE EMPREGO / USO

A dose recomendada é a partir de 130 g/litro, dependendo da intensidade do programa de lactação. Para preparar a dose, misturar com metade da quantidade de água necessária a 45°C. Em seguida, adicionar gradualmente água morna até atingir a concentração desejada e fornecer à vitela a uma temperatura de 39°C.

CONSTITUINTES ANALÍTICOS

Proteína bruta	20.0 %
Gordura bruta	18.0 %
Cinzas brutas	8.0 %
Fibra bruta	0.0 %
Cálcio	0.7 %
Fósforo	0.6 %
Sódio	0.6 %
Vitamina A	25 000 U.I.
Vitamina D3	5 000 U.I.
Vitamina E	300 mg
Zinco (Sulfato de Zn)	84 mg
Manganês (Sulfato de Mn)	45 mg
Ferro (Sulfato de Fe)	90 mg
Cobre (Sulfato de Cu)	10 mg
Iodo (Iodeto de potássio)	2 mg
Selénio (Selenito sódico)	0.3 mg
Galato de propilo	
BHA	
Ácido cítrico	
<i>Enterococcus faecium</i>	
<i>Lactobacillus rhamnosus</i>	

Os valores nutricionais apresentados são médias da formula e podem variar consoante cada formulação, dentro dos limites estabelecidos. As vitaminas e o cobre são correspondentes ao corretor.

NOTA: Todos os rendimentos e quantidades de alimento indicados são estimados. Os resultados dependem de muitos outros fatores para além da alimentação.



Sacos de 10 e 25 kg

NANTA

www.nanta.pt



Para mais informações
visite o nosso site

