


Sabia que...



A **boqueira**, também conhecida como estomatite, é uma inflamação da mucosa da cavidade oral, e pode afetar pequenos ruminantes como ovinos e caprinos. Essa condição impacta negativamente nos resultados de desenvolvimento dos animais, aumentando a morbidade e até mesmo a mortalidade. Diversos agentes podem estar envolvidos na causa da boqueira, incluindo bactérias, vírus e fatores ambientais.



ALGUNS DOS AGENTES MAIS COMUNS SÃO:

● Bactérias

Diversas bactérias podem estar envolvidas, como *Fusobacterium necrophorum*, *Trueperella pyogenes*, e outras.

● Fatores ambientais

Condições ambientais, como alimentação inadequada, stresse e lesões na boca, também podem contribuir para o desenvolvimento da boqueira.

● Vírus

O ectima contagioso, também conhecido como dermatite contagiosa, é uma doença viral que afeta principalmente ovinos e caprinos. A doença é causada pelo vírus da poxvirose caprina, pertencente ao gênero Capripoxvirus. O ectima contagioso é altamente contagioso entre os animais e pode se espalhar rapidamente em rebanhos.



PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DA BOQUEIRA:

- **Lesões Cutâneas:** Os animais infetados desenvolvem lesões na pele ao redor da boca, nariz, olhos, genitais e cascos. As lesões geralmente começam como pequenas pápulas que evoluem para vesículas e, eventualmente, formam crostas.
- **Sintomas Gerais:** Além das lesões na pele, os animais podem apresentar febre, apatia, perda de apetite e salivação excessiva.
- **Contágio:** O vírus é transmitido principalmente pelo contato direto entre animais infetados e saudáveis, através de ferimentos na pele ou mucosas.
- **Prevenção e Controlo:** A prevenção da Boqueira envolve práticas de manejo adequadas, isolamento de animais doentes, e em alguns casos, a vacinação.



AQUI ESTÃO ALGUMAS MEDIDAS COMUNS ADOTADAS NO TRATAMENTO:

- **Isolamento:** Isolar animais doentes é importante para evitar a propagação do vírus para animais saudáveis.
- **Cuidados com as Lesões:** As lesões devem ser mantidas limpas e secas para prevenir infecções secundárias. Pode-se usar soluções antissépticas suaves para limpar as áreas afetadas.
- **Alimentação e Hidratação Adequadas:** Garantir que os animais afetados recebam uma dieta balanceada e tenham acesso a água limpa e fresca é crucial para apoiar a recuperação.
- **Analgésicos e Anti-inflamatórios:** Em alguns casos, o uso de analgésicos e anti-inflamatórios pode ser considerado para aliviar o desconforto e a dor associados às lesões.
- **Vacinação:** Em áreas onde o ectima contagioso é endêmico, a vacinação preventiva pode ser uma estratégia eficaz. A vacinação deve ser discutida com um veterinário, pois as práticas podem variar dependendo da região e das condições específicas do rebanho.



NUTRACÊUTICA
NANTA BLOCK-BOQUERAS
10kg



NANTA