

PROTOCOLO DE REVISIÓN

Llegada a la granja

Terneros mamones

El objetivo de este protocolo es que sirva de herramienta-guía a utilizar en las granjas de terneros mamones, para la prevención, acondicionamiento y desarrollo de los terneros a la llegada de los animales.

1. A la llegada

A modo general comenzaremos el mismo día de la llegada de los animales.

- ☐ Nantamilk a la llegada
- ☐ Rehidratar a las 2 - 4 horas
- ☐ Nantamilk 2 veces días cada 12 horas
- ☐ Tener en cuenta la época del año para ajustar los protocolos
- ☐ Distintas fases → Mamones lactantes - Transición
- ☐ Pienso pre-estárter para terneros de < 50 kg
- ☐ Pienso estándar entre > 50 kg
- ☐ Pienso pre-crecimiento a partir de los 100 kg (transición)

2. Puntos a considerar

Perfil mínimo de la granja

- ☐ Instalaciones limpias y desinfectadas a la entrada de los animales
- ☐ Cama abundante
- ☐ Instalaciones con ausencia de corrientes de aire y con buena ventilación
- ☐ Tener protocolo de manejo de entradas (aislamiento enfermos, agrupación por tamaño, etc.)
- ☐ Garantizar adecuada densidad de animales
- ☐ Bebederos suficientes y limpios, controles periódicos de agua
- ☐ Comederos y forrajeras amplias. Limpieza diaria

Control de pesos

- ☐ Control de peso a la entrada y a la salida de la mamonera
- ☐ Control de peso a la salida de transición



Control de Consumos

- ☐ Control de consumo de pienso a la salida de la explotación
- ☐ Control de consumo de Nantamilk durante todo el ciclo
- ☐ Revisión semanal de consumo de pienso del lote - asegurar crecimiento exponencial del consumo

Control datos zootécnicos a tener en cuenta

- ☐ Control IC a la salida de los animales
- ☐ Control GMD a la salida de los animales
- ☐ Uniformidad del lote
- ☐ Control de mortalidad y morbilidad del lote

Control de mortalidad

- ☐ Bajas diarias
- ☐ Porcentaje de bajas semanales
- ☐ Porcentaje de bajas totales del lote a la salida de los animales
- ☐ Comparación de mortalidad por lotes/proveedores/época año/peso...

3. ¿Qué debemos comprobar durante la etapa de recría de los terneros?

- ☐ Δ consumo de pienso diario (valorar semanalmente)
- ☐ Δ peso de los terneros (valorar semanalmente)
- ☐ Revisión de preparación de Nantamilk
- ☐ Uniformidad del lote
- ☐ El porcentaje de bajas semanal no supera el previsto
- ☐ Estado de las heces
- ☐ Estado de hidratación de los animales
- ☐ Estado sanitario de los animales para detección temprana de enfermedades (temperatura, ecografía, recogida de muestras...)
- ☐ Asegurar que el protocolo sanitario está adaptado a la situación actual

