


Harvey® FINAL



Crescimento, gama Harvey

DEFINIÇÃO / POSICIONAMENTO

Ração completa de finalização de crescimento para administrar a coelhos, 10 a 15 dias antes do abate. Objetivos: índice de conversão nessa fase muito determinante e rendimento de carcaça.

Segmento: cunicultura industrial. Explorações com o modelo Harvey®. A sua formulação contempla a administração em modelos de racionamento, especialmente PLC.

CARACTERÍSTICAS:

- Alto teor de luzerna, polpas e cereais.
- Perfil fechado de matérias-primas.
- Aditivos para a saúde digestiva. MCFA (Ácidos gordos de cadeia média).

BENEFÍCIOS:

- Palatabilidade, melhoria da ingestão.
- Prevenção de problemas digestivos associados a mudanças bruscas.
- Prevenção de problemas digestivos no geral. MCFA - Ácidos gordos de cadeia média.

MODO DE ADMINISTRAÇÃO / UTILIZAÇÃO:

Administrar em todos os modelos de gestão (11 dias pós-parto e Sistema 25) entre 10 e 15 dias antes da venda. Em explorações de Sistema 25, estáveis do ponto de vista digestivo, pode ser administrada como dieta única de crescimento. Estudada para modelos de racionamento, especialmente com PLC.

Componentes Analíticos*

% Proteína Bruta	15,20
% Gordura Bruta	4,00
% Fibra Bruta	17,50
% Cálcio mín.	0,80
% Fósforo mín.	0,44
% Lisina mín.	0,70
% Met + Trip mín.	0,52


Vitamina A mín.	10000 UI
Vitamina D3 mín.	1080 UI
Vitamina E mín.	36 mg/kg
Coccidiostato**	NÃO

**NÃO contém nem Robenidina nem Diclazuril como coccidiostático.


*Valores médios de referência em formulação.

Apresentação GRANEL granulado

Administração 11 dias pós-parto



Administração Sistema 25



NOTA: Todos os rendimentos e quantidades de ração indicados são estimados. Os resultados dependem de muitos fatores para além da alimentação.