


# Harvey® 25



## Maternidade, gama Harvey

### DEFINIÇÃO / POSICIONAMENTO

**Ração completa** destinada a coelhas reprodutoras e suas ninhadas com uma dupla utilização: em modelos de **11 dias pós-parto**, administrar à vontade desde o dia 25 até ao desmame; no **Sistema 25**, administrar à vontade como dieta de maternidade.

**Segmento:** cunicultura industrial. Explorações com o modelo Harvey®.

### CARACTERÍSTICAS:

- Contém uma suplementação de dextrose.
- Nível moderado de PB, mas de alta digestibilidade.
- Entrada de gordura em níveis adequados. Aditivos de segurança digestiva.

### BENEFÍCIOS:

- Diminuição da incidência de toxemias e cetose na lactação.
- Segurança digestiva e preparação do aparelho digestivo do láparo para a fase de crescimento.
- Ganho de peso ao desmame. Menor incidência de diarreias.

### MODO DE ADMINISTRAÇÃO / UTILIZAÇÃO:

Em **modelos de 11 dias**, administrar desde o dia 25 até ao desmame. No **Sistema 25**, administrar como dieta de maternidade. Para a alimentação de coelhas de reposição, consulte o nosso serviço técnico.

### Componentes Analíticos\*

|                   |       |
|-------------------|-------|
| % Proteína Bruta  | 16,40 |
| % Gordura Bruta   | 4,40  |
| % Fibra Bruta     | 16,50 |
| % Cálcio mín.     | 1,00  |
| % Fósforo mín.    | 0,55  |
| % Lisina mín.     | 0,78  |
| % Met + Trip mín. | 0,58  |


|                   |          |
|-------------------|----------|
| Vitamina A mín.   | 12000 UI |
| Vitamina D3 mín.  | 1080 UI  |
| Vitamina E mín.   | 45 mg/kg |
| Coccidiostático** | 60 ppm   |

\*\*Contém Robenidina como coccidiostático. Remoção: 5 dias antes do abate.


\*Valores médios de referência em formulação.

**Apresentação GRANEL granulado**

#### Administração 11 dias pós-parto



#### Administração Sistema 25



NOTA: Todos os rendimentos e quantidades de ração indicados são estimados. Os resultados dependem de muitos fatores para além da alimentação.